

## CLINIQUES VETERINAIRES DES MARCHES DE BRETAGNE

Zone de la Meslais 2 bis place de la République 47, Bd du Maréchal Leclerc  
4, rue Pierre Harel  
**35133 LECOUSSE** **35300 FOUGERES** **35 460 ST BRICE EN COGLES**  
tél 02 99 94 43 09 fax 02 99 99 87 23 Tél 02 99 99 04 40 fax 02 99 99 75 36 tél 02 99 18 55 84 fax 02 99 18 56 77

## LETTRE D'INFORMATION NOVEMBRE 2020

### Nouveau ! Formation écornage individuelle

Nous vous proposons de venir vous former dans votre exploitation à l'écornage de vos veaux.

Concrètement, comment ça se passe ? pour la formation, vous nous mettez à disposition entre 3 et 5 veaux âgés de 3 semaines à 2 mois. Sur le premier veau, nous vous montrons les techniques de tranquillisation, d'anesthésie locale, de gestion de la douleur et de l'écornage. Ensuite c'est vous qui pratiquez sur les autres veaux sous notre supervision.

A l'issue de cette formation individuelle, vous connaîtrez le protocole complet ainsi que la technique de la prise en charge de la douleur. Nous vous délivrerons également une attestation d'aptitude à la gestion de l'écornage sans douleur.

### Opération Diagnostic Parasitaire, c'est le moment !

Les vaches et génisses vont bientôt rentrer à l'étable et c'est le moment de savoir quelle a été l'ampleur de l'exposition aux parasites (strongles et douve) pendant la saison de pâturage.

Pour évaluer cette exposition, il est possible d'avoir recours à différents types d'analyses. Les résultats obtenus permettront non seulement :

- de connaître l'exposition aux parasites au cours de la saison de pâture passée
- de savoir quelle stratégie adopter en matière de traitement antiparasitaire pour cet hiver

Il existe différents moyens pour évaluer cette exposition selon le parasite recherché et l'âge des animaux :

- **Pour les génisses de 1<sup>ère</sup> saison de pâture** : dosage du pepsinogène sérique à partir de prélèvement de sang. Pour être interprétable, il est nécessaire de prélever 5 génisses du même lot.
- **Pour les vaches en lactation** : mesure de la densité optique à partir d'un échantillon de lait de tank.
  - o Pour effectuer un prélèvement à partir du lait de tank, il est nécessaire d'utiliser des pots de prélèvement avec conservateur (bromopole) remplis à moitié et de nous les apporter à la clinique (attention à bien mélanger le lait avec le conservateur et de mettre le prélèvement au congélateur). Vous pouvez récupérer des pots de prélèvement à la clinique.
  - o Il est possible de rechercher à la fois les strongles et la douve.

La tarification de cette formation est basée sur un forfait horaire : **100€ HT de l'heure** (en plus du déplacement).

Du **15 novembre au 30 novembre**, nous vous offrons les frais d'analyse. **Attention !!!** le nombre d'analyses offertes est limité !

## Hygiène de traite : sécurisez vos pratiques !

L'automne étant déjà là, les vaches passent de plus en plus de temps en stabulation et le risque de survenue de mammites cliniques, notamment de mammites d'environnement est accrue.

Pour limiter le risque de contamination, nous vous proposons une gamme d'hygiène de traite parfaitement adaptée pour cette saison :

<b>Novactiv Xcell Max</b>	Pré et post trempage Dioxyde de chlore, la référence en <b>désinfection</b> avant la traite	La solution en cas de <b>montée de cellules</b>
<b>Novactiv Xcell Mix</b>	Post trempage avec <b>obturation du trayon</b> (effet barrière) Dioxyde de chlore	La <b>référence pour prévenir les contaminations entre les traites</b> . A privilégier en aire paillée
<b>Iododip Plus</b>	Post trempage avec obturation du trayon Iode concentré à 5000ppm	Solution <b>pratique et économique</b>
<b>Novactiv Film</b>	Post trempage Complexe LSA, Aloé Vera La <b>référence en cosmétique</b> et fort pouvoir <b>désinfectant</b> Puissant effet <b>filmogène</b>	A privilégier pour prendre <b>soins de la peau</b> des trayons <b>Réparation des trayons abimés</b> (gerçure, peau sèche...)

## Mammites : savoir quel germe combattre

Les mammites sont provoquées par des bactéries (E. coli, Staphylocoques, Streptocoques...) et l'approche en termes de traitement et prévention ne sera pas la même en fonction de la bactérie isolée. Il est donc important d'identifier la bactérie pour mieux la combattre.

Dans une même exploitation plusieurs germes peuvent provoquer des mammites mais souvent il existe souvent un germe dominant responsable de la majorité des mammites. Pour l'identifier, nous vous conseillons de faire **au minimum 5 analyses bactériologiques** sur du lait de mammité ou du lait à cellules.

Pour vous permettre de gérer au mieux votre problématique de mammites nous vous proposons le service « **Diagnostic Mammité** » qui comprend :

- 5 analyses bactériologiques
- Une interprétation de vos analyses associée à des recommandations tant sur le plan traitement (choix de la molécule la plus adaptée à votre exploitation) que prévention.

## En bref...

- **Confinement jusqu'au 1<sup>er</sup> décembre** : pour le moment, nous n'avons pas de restriction concernant notre activité. Nous pourrions donc continuer à vous accueillir dans nos locaux et effectuer les visites habituelles, dans le respect des gestes barrières.
- **Report de la formation « Coloastro-Notes »**. La formation concernant le colostrum, initialement prévue le 2 et 3 novembre a été reportée à une date ultérieure (courant janvier si les conditions sanitaires le permettent). Si vous êtes intéressés, vous pouvez le signaler au secrétariat qui vous tiendra informé de la nouvelle date quand elle sera fixée.

**Le saviez-vous ?** Pour certains produits, nous disposons de gros conditionnements livrables gratuitement directement en ferme. N'hésitez pas à vous renseigner !

Le service « Diagnostic mammité » vous est proposé au **tarif de 90€ HT**