

CLINIQUES VÉTÉRINAIRES DES MARCHES DE BRETAGNE

Zone de la Meslais
4, rue Pierre Harel
35133 LECOUSSE

2 bis place de la République
35300 FOUGERES

47, Bd du Maréchal Leclerc
35 460 ST BRICE EN COGLES

LETTRE D'INFORMATION NOVEMBRE 2021

Opération Diagnostic Parasitaire, c'est le moment !

Les vaches et génisses vont bientôt rentrer à l'étable et c'est le moment de savoir quelle a été l'ampleur de l'exposition aux parasites (strongles et douve) pendant la saison de pâturage.

Pour évaluer cette exposition, il est possible d'avoir recours à différents types d'analyses. Les résultats obtenus permettront non seulement :

- de connaître l'exposition aux parasites au cours de la saison de pâture passée
- de savoir quelle stratégie adopter en matière de traitement antiparasitaire pour cet hiver

Il existe différents moyens pour évaluer cette exposition selon le parasite recherché et l'âge des animaux :

- **Pour les génisses de 1^{ère} saison de pâture** : dosage du pepsinogène sérique à partir de prélèvement de sang. Pour être interprétable, il est nécessaire de prélever 5 génisses du même lot.
- **Pour les vaches en lactation** : mesure de la densité optique à partir d'un échantillon de lait de tank.
 - o Pour effectuer un prélèvement à partir du lait de tank, il est nécessaire d'utiliser des pots de prélèvement avec conservateur (bromopole) remplis à moitié et de nous les apporter à la clinique (attention à bien mélanger le lait avec le conservateur et de mettre le prélèvement au congélateur). Vous pouvez récupérer des pots de prélèvement à la clinique.
 - o Il est possible de rechercher à la fois les strongles et la douve.

Prévention non médicale des pneumonies

Il est possible de limiter l'impact des pneumonies dans les élevages en ayant recours à certaines précautions non médicales :

- **Tondre la ligne du dos des veaux** : elle évite à l'humidité de s'accumuler le long de la ligne du dos et ainsi à augmenter la sensation de froid du veau.
- **Pailler abondamment** les niches individuelles et les cases collectives. Pour les niches, cela correspond à remplir la niche presque au 2/3 avec de la paille avant de mettre le veau. Pour les cases collectives, cela correspond à 10Kg par m² de surface.
- **Aménager des zones de confort** en installant un plafond amovible à 1,8– 2 m de hauteur sur une longueur et largeur adaptée au nombre de veaux présents dans chaque case : 1 m²/veau. Préférer pour la couverture de ce plafond une paroi perméable (paille, géotextile)
- **Ne pas trop charger les cases collectives** : moins il y a de surface disponible par veau, plus il y a de veaux malades. Exemple : un passage de 3m² par veau à 2m² par veaux multiplie de risque de pneumonie par 3 !


Du **15 novembre au 30**

novembre, une remise de 50% est accordée sur les frais d'analyse. Soit un prix après remise de :

- 6€ HT pour les densités optique sur lait de tank
- 35€ HT le dosage de pepsinogène pour 5 génisses.



Une niche avant d'y mettre un veau doit être quasiment remplie de paille



Aménagement de zone de confort

Hygiène de traite : sécurisez vos pratiques !

L'automne étant déjà là, les vaches passent de plus en plus de temps en stabulation et le risque de survenue de mammites cliniques, notamment de mammites d'environnement est accrue.

Pour limiter le risque de contamination, nous vous proposons une gamme d'hygiène de traite parfaitement adaptée pour cette saison :

Le saviez-vous ? Pour certains produits, nous disposons de gros conditionnements livrables gratuitement directement en ferme. N'hésitez pas à vous renseigner !

Novactiv Xcell Max	Pré et post trempage Dioxyde de chlore, la référence en désinfection avant la traite	La solution en cas de montée de cellules
Novactiv Xcell Mix	Post trempage avec obturation du trayon (effet barrière) Dioxyde de chlore	La référence pour prévenir les contaminations entre les traites . A privilégier en aire paillée
Iododip Plus	Post trempage avec obturation du trayon Iode concentré à 5000ppm	Solution pratique et économique
Novactiv Film	Post trempage Complexe LSA, Aloé Vera La référence en cosmétique et fort pouvoir désinfectant Puissant effet filmogène	A privilégier pour prendre soins de la peau des trayons Réparation des trayons abimés (gerçure, peau sèche...)

Comment lutter contre les non-délivrances et les métrites ?

Les non-délivrances et les métrites sont deux pathologies qui peuvent peser lourd en termes de budget dans l'exploitation. Le coût d'une telle pathologie est estimé à environ 252€ par évènement, notamment en lien avec la perte de lait engendrée. Il s'agit aussi d'un facteur de risque non négligeable de déplacement de caillette car les vaches atteintes d'une métrite présentent un appétit diminué.

Il y a un lien très étroit entre la gestion du tarissement et l'apparition d'une flambée de non-délivrances et/ou de métrites. Si cela vous arrive, nous pouvons vous aider à améliorer la situation, notamment par le biais d'un **diagnostic tarissement**.

Pour limiter le risque de non-délivrance ou pour en traiter une ainsi qu'une métrite, nous vous proposons deux bolus complémentaires : **Obidéli** et **Obimétri**.

Ces bolus contiennent des minéraux, des oligo-éléments, des molécules stimulant le foie ainsi que des huiles essentielles ayant entre autres des vertus antiseptiques et utérotoniques puissantes (l'involution utérine est plus rapide).

Le saviez-vous ?

- A la boîte, le tarif est plus économique !

- **Nouveau !** une version agréée en élevage biologique existe : **Obinactérus**

Obideli	Magnésium, calcium, calendula, choline rumino-protégée, lysine, huile essentielle de clou de girofle, sorbitol, cuivre, manganèse, zinc. Délitement sur 24h.	Prévention contre les non-délivrances 1 bolus à faire avaler au moment du vêlage ou dans les heures qui suivent (maximum 12h).
Obimétri	Sorbitol, magnésium, calendula, armoise, huiles essentielles de clou de girofle, de tea tree et de cannelle Délitement sur 10 jours	Traitement complémentaire des non-délivrances et des métrites. 1 bolus à faire avaler si vêlage datant de plus de 12h et/ou après un vêlage difficile et/ou une métrite.