

CLINIQUES VÉTÉRINAIRES DES MARCHES DE BRETAGNE

Zone de la Meslais
4, rue Pierre Harel
35133 LECOUSSE

2 bis place de la République
35300 FOUGERES

47, Bd du Maréchal Leclerc
35 460 ST BRICE EN COGLES

LETTRE D'INFORMATION JANVIER 2022



Avec cette nouvelle année qui commence, nous vous présentons nos meilleurs vœux pour l'année 2022 !

Diarrhées des veaux : comment agir ?

Le saviez-vous ?

- la diarrhée du veau contient des quantités très importantes de germes pouvant contaminer les autres veaux. Il est important d'isoler le veau malade et de désinfecter la zone avant de remettre un veau au même endroit.
- la gestion du veau malade est aussi importante que le traitement : couverture des besoins énergétiques, lutte contre le froid...
- votre Bilan Sanitaire contient des protocoles de traitement et de prévention de la diarrhée du veau.

- Nous pouvons vous accompagner dans vos choix par le biais d'un audit qui permettra de d'adapter la prévention à votre conduite d'élevage

J'ai un veau malade, que faire ?

Vous pouvez effectuer un examen clinique pour déterminer la gravité de la diarrhée :

- **Température** : norme 38,5-39,5°C. Si le veau est en hypothermie, il faut le réchauffer (lampe chauffante, bouillote, couverture, épaisse couche de paille...)
- **Posture/Attitude** : dynamique, mou, couché ? Si le veau est couché, une perfusion sera nécessaire. Sinon une réhydratation par voie orale peut être tentée.
- **En acidose** ? mettre le doigt dans la bouche du veau. Si le veau a un comportement anormal de succion (serrage excessif de la mâchoire, absence de succion, mouvement anormaux) il est probablement en acidose. Il n'aura pas la capacité de boire normalement la buvée. Le sondage œsophagien ou la perfusion par voie veineuse sera donc nécessaire pour corriger l'acidose.
- **Déshydraté** ? deux façons d'évaluer la déshydratation : l'enfoncement du globe oculaire et la persistance du pli de peau. Si les yeux sont enfoncés dans les orbites ou si le pli de peau après avoir pincé la peau de l'encolure persiste plus de 2 secondes, le veau est déshydraté. Il va donc falloir corriger la déshydratation en apportant de l'eau, soit par voie orale si son état général est bon, soit par voie veineuse dans le cas contraire.
- **Nombril enflé, douloureux** ? Si c'est le cas, la porte d'entrée se situe au niveau du nombril et un traitement spécifique est nécessaire

J'ai plusieurs veaux malades, que faire ?

Si plusieurs veaux sont malades, le recours à une analyse de selles diarrhéiques du ou des veaux malades est nécessaire. Cette analyse permettra d'identifier le ou les germes responsables des diarrhées et ainsi

- d'ajuster le traitement pour augmenter son efficacité
- de vous proposer des solutions de prévention pour limiter le nombre de veaux malades et la gravité des symptômes.

Réhydratation par voie orale, les bases

Rôles du sachet repas

La diarrhée occasionne la fuite de différents éléments : eau, minéraux, bicarbonate...

Le premier rôle d'un sachet repas va donc être de compenser ces pertes. Dans un premier temps il est préférable de mélanger les sachets repas avec de l'eau, permettant ainsi de corriger la déshydratation. Par la suite, quand la déshydratation sera corrigée et si le sachet repas le permet, il pourra être dilué dans du lait.

Les sachets repas peuvent aussi aider à lutter contre la diarrhée en augmentant la consistance de la diarrhée (rôle de pansement digestif) et en ensemençant le tube digestif avec de la flore non pathogène (compétition contre la multiplication et/ou la fixation des germes pathogènes) ... Ci-dessous, les principaux sachets présents dans nos structures.

Faut-il couper le lait ? Pendant combien de temps ?

La plupart des sachets repas n'apportent pas suffisamment d'énergie pour compenser les besoins énergétiques du veau. Couper le lait prive ainsi le veau de sa source d'énergie principale : il est affaibli, il est moins apte à lutter contre la maladie et a tendance à maigrir. Par moment, couper le lait trop longtemps pose également des problèmes lors de la reprise normale de l'alimentation lactée : des veaux rechutent et parfois meurent.

Voici un exemple de plan de réhydratation :

- Pendant 24-48h,
 - o donner un repas de 2L d'eau mélangé avec des sachets réhydratants le matin et le soir
 - o Donner 1,5L de lait le midi entre les deux repas de réhydratant (intervalle de 4h entre les repas)
- Puis, si le veau va mieux et tant qu'il a la diarrhée, maintenir un repas contenant du réhydratant, soit mélangé au lait si le sachet est compatible, soit mélangé à l'eau (dans ce cas-là, donner un repas de lait de 2L le matin et le soir et un repas de réhydratant le midi)

Le saviez-vous ?






- Il ne faut pas couper le lait plus de 12h !
- **Optinutral** est un réhydratant qui permet de répondre complètement aux besoins énergétiques du veau
- Le coût d'un épisode de diarrhée est estimé à **100€ HT par veau**.

Rien ne vaut la prévention !

Une diarrhée chez le veau, même bien gérée a un impact important sur ses performances de croissance. Avec un objectif de croissance élevé, les diarrhées néonatales sont interdites !

Prélèvement, analyses, prise de colostrum, vaccination des vaches tarées, ensemencement du tube digestif avec une flore de barrière, nettoyage/désinfection... tous les moyens sont bons pour y remédier.

Nous sommes à votre disposition pour vous accompagner dans la gestion de cette pathologie et du démarrage du veau.

			Mélangeable au lait	Le plus produit
	Benital Plus	Contient des pectines qui gélifient le contenu intestinal afin d'éliminer les bactéries	Oui	Meilleur rapport qualité/prix
	Enerlac	Contient du lactosérum	Oui	Valeur énergétique élevée
	Enerlyte	Pouvoir tampon le plus fort (bonne correction de l'acidose) Contient du lactosérum et des levures vivantes	Non	Effervescent, Très bonne dilution dans l'eau
	Omnidiar	Bon pouvoir tampon Ensemencement de l'intestin Tapissage intestinal Énergétique	Oui	Le plus complet
	Optinutral	Le plus riche en énergie Bon pouvoir tampon Prébiotique de dernière génération (Yang)	Non	Couverture des besoins énergétiques du veau