

CLINIQUE VETERINAIRE DES MARCHES DE BRETAGNE

Zone de la Meslais
4, rue Pierre Harel
35133 LECOUSSE

2 bis place de la République
35300 FOUGERES

47, Bd du Maréchal Leclerc
35 460 ST BRICE EN COGLES

LETTRE D'INFORMATION FEVRIER 2023

Prise en charge des mammites avec répercussions sur l'état général

Les mammites avec répercussion sur l'état général sont aussi appelées mammites aiguës, mammites colibacillaires ou mammite de grade 3.

Ces mammites, non seulement ont un effet sur l'aspect du lait, sur le quartier, mais aussi se manifestent par des symptômes généraux plus ou moins graves (hyperthermie, baisse d'appétit, baisse de la rumination, impossibilité de se relever...) pouvant aller jusqu'à la mort.

Plus vite ce type de mammite est pris en charge, plus vite la vache guérira et plus élevées seront les chances de récupération. Pour pouvoir prendre en charge rapidement cette maladie, il faut la détecter rapidement. La fièvre est le symptôme le plus précoce (et souvent fugace) à apparaître, donc **quand vous avez une mammite, même d'aspect « normal », ayez le réflexe « Prise de température »**. L'aspect du lait, non seulement ne permet pas de savoir si la mammite est bénigne ou grave mais en plus ne donne pas d'indication sur la bactérie responsable de la mammite.

En plus d'un traitement antibiotique adapté, d'autres mesures sont à prendre :

- **Hydratation** par voie orale (drenchage) et/ou par voie veineuse (perfusion). Si votre vache ne mange pas et ne boit pas, appelez-nous pour l'hydrater. Si la vache est couchée, il est important de lui mettre à disposition en permanence de l'eau à sa portée.
- **Traire la vache** au minimum 2 fois par jour. La traite fait partie du traitement, et représente même une partie importante de la prise en charge, même si la vache est incapable de se relever. La traite (mécanique ou à la main) du quartier permet d'évacuer le lait contaminé. Ne pas oublier de contrôler les autres quartiers.
- **Mettre la vache en sécurité**. Avec ce type de mammite, il n'est pas rare que la vache titube, soit « fragile sur ses pattes » ... La mettre dans une zone sécurisée (aire de couchage propre) isolée des autres vaches (notamment les vaches en chaleur) est une précaution importante. Il faut la maintenir aussi longtemps que nécessaire, même si son état s'améliore. Tant qu'elle n'est pas totalement rétablie, elle risque de se faire bousculer par ses congénères et de tomber voire de s'équasiller.
- **Utilisez des anti-inflammatoires** de type Tolfine, Genixine ou Métacam : ils diminueront l'inflammation au niveau de la mamelle et soulageront la vache et faciliteront sa récupération.

Des mammites souvent d'origine environnementales. Le réservoir des mammites aiguës est souvent constitué par l'environnement (surface de couchage). Pour prévenir ces mammites, le recours à des produits de **post-trempage à effet barrière** et à des produits de **pré-trempage mousse** (et papier) permettent à la fois d'empêcher les bactéries de pénétrer par le sphincter du canal du trayon et de décontaminer le trayon avant de brancher la vache.



Charriot de traite permettant de traire une vache malade en sécurité. Il permet aussi de traire une vache rapidement après le vêlage, permettant ainsi d'obtenir du colostrum de bonne qualité.

Mammitte aiguë :

- prise de température systématique à chaque mammitte
- hydratation
- traite matin et soir, même couchée
- anti-inflammatoire
- mise en sécurité

Prévention contre les mammites d'origine environnementales

Effet barrière et décontamination du trayon sont les priorités lorsque l'on a affaire à des mammites dont le réservoir est environnemental. Nous vous proposons des produits d'hygiène de qualité :

Avant la traite	Novactiv Xcell Max	Pré et post trempage Dioxyde de chlore, la référence en désinfection avant la traite	La solution en cas de montée de cellules
Après la traite	Novactiv Xcell Mix	Post trempage avec obturation du trayon (effet barrière) Dioxyde de chlore	La référence pour prévenir les contaminations entre les traites . A privilégier en aire paillée
	Iododip Plus	Post trempage avec obturation du trayon Iode concentré à 5000ppm	Solution pratique et économique
	Novactiv Film	Post trempage Complexe LSA, Aloé Vera La référence en cosmétique et fort pouvoir désinfectant Puissant effet filmogène	A privilégier pour prendre soins de la peau des trayons Réparation des trayons abimés (gerçure, peau sèche...)

Groupe de travail « Gestion du Pâturage » : rendez-vous le 15 mars !

Après la formation du 9 novembre avec Mathieu BESSIERE sur la gestion du pâturage tournant dynamique, nous vous proposons de nous rejoindre, toujours avec Mathieu BESSIERE, le **mercredi 15 mars (formation à la journée)**.

Au programme : le pâturage et les problématiques du moment (mise à l'herbe, déprimage...) avec visite de deux exploitations (une le matin et l'autre l'après-midi).
Si vous n'avez pas suivi la formation du 9 novembre, vous pouvez quand même vous inscrire, n'hésitez pas à nous contacter !

Pneumonie des veaux : restez vigilant !

La fin de l'hiver est souvent une période à risque important de pneumonie notamment chez les veaux. La concentration dans les bâtiments, l'humidité et l'alternance chaud/froid sont propices au développement des pneumonies.

Le principal moyen à court terme d'éviter que les troubles respiratoires n'arrivent dans votre exploitation est le recours à la vaccination.

Bovilis intranasal RSP Live permet une mise en place d'immunité rapide, efficace et durable contre les virus du RS et du Pi3. En 10 jours post administration, les veaux sont protégés pendant 3 mois.

Nous pouvons également vous accompagner dans la démarche de prévention, en effectuant par exemple un audit de votre bâtiment veau. N'hésitez pas à nous solliciter !

