

CLINIQUES VÉTÉRINAIRES DES MARCHES DE BRETAGNE

Zone de la Meslais
4, rue Pierre Harel
35133 LECOUSSE

2 bis place de la République
35300 FOUGERES

47, Bd du Maréchal Leclerc
35 460 ST BRICE EN COGLES

LETTRE D'INFORMATION MARS 2021

C'est la vache qui a raison ! Les logettes.

Les logettes sont souvent dimensionnées de la même façon dans les différents bâtiments d'élevage (1,2m de large, 2,8m de profondeur face à un mur...) alors que les vaches ne sont pas uniformes que ce soit d'un élevage à l'autre mais aussi au sein d'un même élevage : les primipares sont souvent plus petites que les multipares.

Plutôt que d'appliquer les « bonnes » dimensions, celles recommandées par la plupart des fabricants, il est plutôt conseillé dans un premier temps de se poser la question suivante : « mes logettes sont-elles bien adaptées à mes vaches ? ».

Pour commencer à répondre à cette question, l'observation de vos vaches peut être une source d'information intéressante, notamment en exprimant des comportements et/ou des postures anormales

- Vache **perchée** : vache ayant 2 pattes avant dans les logettes et les 2 pattes arrière en dehors, dans le couloir de circulation.
- Vache **désœuvrée** : vache immobile, qui ne mange pas, qui n'est pas en interaction avec ses congénères et qui n'est pas en contact avec les logettes
- Vache présentant des **dépilations, déformations** ou des **bosses**, notamment le long de la colonne vertébrale ou au niveau des jarrets.
- Vache **inversée**, couchée tête tournée vers l'entrée de la logette



Vaches de taille différente, quelles dimensions choisir pour les logettes ?

Le saviez-vous ? nous disposons d'une caméra Time Lapse permettant de visualiser sur une courte durée le comportement de vos vaches sur 24h. Cette caméra prend une photo toutes les 4 secondes pendant 24h. Visualisé à vitesse très rapide, en quelques minutes, ce film nous montre en accéléré le comportement des vos vaches sur la journée, nous permettant ainsi de détecter des anomalies éventuelles dans leurs déplacements, attitudes...



Vache perchée



Dépilation et lésion au niveau du jarret

Tout est une affaire de proportion, exemple

- Perte de poils sur les jarrets : pas plus de 20% des vaches
- Pas plus de 10% de vaches perchées parmi les vaches debout dans les logettes
- Plus de 85% des vaches dans les logettes sont couchées.

Si vous constatez des anomalies concernant votre troupeau, si vous avez un projet de construction/rénovation d'un bâtiment, nous pouvons vous apporter des conseils adaptés à votre élevage. N'hésitez pas à faire appel à nous !

Pneumonie des veaux : restez vigilant !

La fin de l'hiver est souvent une période à risque important de pneumonie notamment chez les veaux. La concentration dans les bâtiments, l'humidité et l'alternance chaud/froid sont propices au développement des pneumonies.

Le principal moyen à court terme d'éviter que les troubles respiratoires n'arrivent dans votre exploitation est le recours à la vaccination.

Bovilis intranasal RSP Live permet une mise en place d'immunité rapide, efficace et durable contre les virus du RS et du Pi3. En 10 jours post administration, les veaux sont protégés pendant 3 mois.

Nous pouvons également vous accompagner dans la démarche de prévention, en effectuant par exemple un audit de votre bâtiment veau. N'hésitez pas à nous solliciter !

Ne pas tarir des vaches à plus de 20Kg de lait !

Le tarissement des vaches fortes productrices, si elles produisent encore beaucoup de lait au moment du tarissement (plus de 20Kg), peut avoir des conséquences non seulement sur le confort des vaches (pression mammaire engendrant de l'inconfort, un temps de couchage moins important, un risque plus élevé d'expulsion de l'obturateur de trayon), mais aussi sur la qualité du lait en début de lactation (risque de mammite augmenté).

Pour favoriser la baisse de la production des vaches hautes productrices, plusieurs solutions existent :

- Traire la vache une fois sur deux les 3 jours qui précèdent le tarissement
- Utiliser des produits dédiés
 - o **Bovikalc dry** : 2 bolus à faire avaler 8 à 12h avant la dernière traite
 - o **Orotar** (homéopathie) : faire avaler 1 flacon de granules au moment du tarissement
 - o **Coup'Lait** (phytothérapie) : 100mL à faire avaler en une fois au moment du tarissement

Après la traite, séparer l'animal du troupeau en production, isoler l'animal de la salle de traite pendant 48h.

Mise à l'herbe des bovins, pensez à la complémentation en oligo-éléments !

Le sol vit au rythme de la météorologie : précipitations, sécheresse jouent sur le lessivage ou l'immobilisation des oligo-éléments, limitant l'assimilation par les plantes.

Les **carences chez les animaux sont sources de nombreuses conséquences cliniques et zootechniques** : pertes de production, baisse de fertilité, réduction du transfert d'immunité colostrale et pathologies néonatales.

Pour compléter vos animaux, diverses solutions adaptées à chaque conduite d'élevage existent : bolus, galets effervescents, granulés. Ces différentes solutions sont **plus efficaces et économiques que les seaux à lécher, la bonne prise des oligo-éléments est assurée !** Avec les seaux, il n'y a aucune maîtrise de la prise réelle et les oligo-éléments sont dégradés au fil du temps.

En bref... arrêt des contrôles de la tuberculination lors d'achat

Lors des **achats**, il n'est plus nécessaire de contrôler la tuberculose. Les tests cutanés sont donc arrêtés dans le cadre des achats.

Le saviez-vous ?

Orotar et Coup'Lait sont agréés en agriculture biologique.



Attention ! : mettre les vaches tarées au régime paille pendant quelques jours est une pratique à haut risque à proscrire absolument. Même remarque concernant toute éventuelle restriction d'eau.

Les bolus « **Oligovet Pâturages** » existent en différentes tailles, permettant de compléter depuis les génisses à partir de 100Kg de poids jusqu'aux vaches adultes

