

S.C.P. DES MARCHES DE BRETAGNE

Zone de la Meslais
4, rue Pierre Harel
35133 LECOUSSE
tél 02 99 94 43 09 fax 02 99 99 87 23

2 bis place de la République
35300 FOUGERES
Tél 02 99 99 04 40 fax 02 99 99 75 36

47, Bd du Maréchal Leclerc
35 460 ST BRICE EN COGLES
tél 02 99 18 55 84 fax 02 99 18 56 77

Y. FOUQUE

G. GOUNOT
R. VAN GRINSVEN

J-P. LE PAGE

F. DONON
G. MANCEAU

J-O DESMAREZ

LETTRE D'INFORMATION JANVIER 2019



Avec cette nouvelle année qui commence, nous vous présentons nos meilleurs vœux pour l'année 2019 !

Parce que la reproduction constitue la plaque tournante de votre élevage, nous dédions une grande partie de cette lettre mensuelle à cette thématique et nous mettons en avant en ce début d'année les différents moyens permettant d'améliorer ce poste et par conséquent votre rentabilité.

La Reproduction, pilier de la rentabilité de votre élevage

Le saviez-vous ?

- Au-delà d'un IVV de 400 jours, chaque jour supplémentaire coûte entre 2 et 4 €/j de retard :
 - o Exemple : pour un troupeau de 75 vaches avec un IVV de 427 j, cela représente un **manque à gagner de 6000 €/an soit 80 €/vache/an**
- Gagner 1 mois de stade de lactation moyen sur le troupeau permet d'augmenter le potentiel laitier entre 8 et 10 %
 - o Exemple : un troupeau de 75 vaches à 28 L/j avec un MML (Mois Moyen de Lactation) de 7 aurait un potentiel laitier de 30,5 L avec un MML de 6.

La reproduction n'est pas qu'une question de performances en terme de fécondité. Elle est au cœur de la rentabilité de votre exploitation. **Nous sommes à même de vous accompagner dans votre progression.**

Le saviez-vous ? le lait par jour de vie correspond à la quantité de lait que produit une vache pendant sa carrière laitière en prenant en compte son âge. Ainsi sont prises en compte les périodes improductives : élevage des génisses et tarissements. Il s'agit donc d'un **critère de rentabilité** important à prendre en compte.

Pour obtenir une bonne productivité, donc une bonne rentabilité par vache, il faut :

- Diminuer l'intervalle Vêlage-Vêlage = Fécondité
- Augmenter les chances de féconder une vache lors d'une chaleur = Fertilité (TRIA1 et TRIA1+2)
- Réduire les périodes non productives :
 - Diminuer l'âge au 1^{er} vêlage
 - Diminuer l'intervalle vêlage-IA1
 - Augmenter la longévité



Aujourd'hui, le nombre de litres de lait par jour de vie est considéré comme l'un des indicateurs synthétiques de rentabilité les plus pertinents en élevage laitier (mini 12 L/j de vie et objectif > 14 L lait/j de vie).

*Seeghers et al., 1999

**Donnée interne MSD Santé Animale non publiée

Nous vous proposons de réaliser avec vous un **audit reproduction gratuitement** dans votre ferme pour évaluer de manière précise votre situation.

Contactez-nous pour de plus amples informations !



Jeudi 31 janvier 14h
Réunion
d'information



Jeudi 17 janvier 11h
Réunion
d'information

Reproduction : Comment se situe votre élevage ?

Vous trouverez dans le tableau ci-dessous, les principales performances de reproduction à considérer ainsi que les objectifs à atteindre. N'hésitez pas à confronter ces données avec la performance de votre exploitation.

▼ Objectifs de suivi des performances de reproduction en troupeau laitier

	TRÈS BON	BON	À AMÉLIORER	VOTRE ÉLEVAGE
IVV (jours)	< 385	385-400	> 400	
Age au 1 ^{er} vêlage (mois)	24	24-27	> 27	
TRIA1 (%)	> 60	50-60	< 50	
TRIA1+2 (%)	> 80	75-80	< 75	
Nombre de paillettes	< 1,5	1,5-2	> 2	

Le suivi reproduction, pas que du tourisme rectal !

Le suivi reproduction ne se limite pas à la détection des métrites, des anomalies ovariennes expliquant une infécondité ou un anoestrus...

Certes, il s'agit d'examen incontournables du suivi car ils permettent à la fois de débloquer une situation à problème et de remettre la reproduction des vaches infertiles dans le droit chemin mais aussi ils permettent de faire un état des lieux régulier de la situation de la reproduction dans votre élevage (combien de métrites ce mois-ci ? combien de non délivrances, de vaches en anoestrus ?).

Mais ce constat est essentiellement un constat a posteriori car si la situation à un instant « t » est dégradée, les origines de la dégradation sont souvent situées bien en amont : démarrage de la lactation, gestion du tarissement et même élevage des génisses !

Le suivi Reproduction est donc l'occasion de corriger des problèmes ponctuels, de voir si la situation se dégrade mais aussi de veiller au bon fonctionnement de votre exploitation par l'observation des différentes catégories de votre élevage (vaches en production, vaches tarées et génisses) et par la mise en évidence des situations à risque susceptibles de se détériorer plus tard.

Nous avons le plaisir de vous inviter à une réunion d'information qui aura lieu le jeudi 31 janvier à 14h à la clinique de Lécousse sur les principaux critères ayant un lien avec la reproduction et les moyens dont nous disposons pour vous accompagner .

Réunion d'information « Hygiène de traite » jeudi 17 janvier à 11h

En cette saison, les mammites sont prépondérantes. Selon le type de bactéries à l'origine des mammites, les stratégies de lutte ne sont pas les mêmes mais elles ont toutes un point commun : la gestion de l'hygiène autour de la traite (avant, pendant et après). En adoptant la bonne stratégie, il est possible de diminuer de manière considérable le nombre de mammites et ainsi la quantité de traitement anti mammite.

Pour en savoir plus, nous vous proposons une réunion d'informations consacrée à la problématique des mammites et de leur gestion par l'hygiène de traite **jeudi 17 janvier à la clinique de Lécousse à 11h**. Un repas suivra cette réunion.

Si vous souhaitez vous inscrire, appelez-nous !