

S.C.P. DES MARCHES DE BRETAGNE

Zone de la Meslais
4, rue Pierre Harel
35133 LECOUSSE
tél 02 99 94 43 09 fax 02 99 99 87 23

2 bis place de la République
35300 FOUGERES
Tél 02 99 99 04 40 fax 02 99 99 75 36

47, Bd du Maréchal Leclerc
35 460 ST BRICE EN COGLES
tél 02 99 18 55 84 fax 02 99 18 56 77

Y. FOUQUE

G. GOUNOT

J-P. LE PAGE
G. MANCEAU

F. DONON

J-O DESMAREZ


LETTRE D'INFORMATION JUILLET 2020

Avec le Trusti Fiber, simplifiez-vous la prise de colostrum !

La prise de colostrum à la naissance est déterminante pour la santé du veau. Nous avons référencé un nouveau dispositif permettant d'administrer le colostrum de manière simplifiée et sécurisée : le Trusti Tuber. Voici les principales recommandations d'utilisation :



Faire avaler le tube rigide jusqu'à la butée.



Faire coulisser le tube flexible dans le tube rigide jusqu'à la bague de blocage.

Il est possible de vérifier le bon positionnement du tube flexible en palpant le cou du veau du côté gauche.



Réglage de la bague de blocage : le marquage du poids correspond à une longueur minimum d'introduction du tube flexible à atteindre (ne pas sous-estimer le poids du veau ou, en cas d'administration à plusieurs veaux, réglez la bague en fonction du veau le plus lourd).



Levez le bidon contenant le colostrum. Pas besoin, de régler le débit. Une fois le bidon vide, retirez d'abord le tube flexible puis le tube rigide.



Fortes chaleurs estivales, quelques précautions à prendre



Ombre et apport d'eau sont les principales précautions à prendre. Toutes les catégories d'âges sont concernées.

En cas de coup de chaleur, la première chose à faire est de mouiller abondamment la vache.

L'été risque d'être à nouveau chaud. En cas de forte chaleur, les vaches mangent moins, restent plus longtemps debout, présentent un risque d'acidose plus important (baisse de production de salive et perte de bicarbonate par la respiration) et adoptent des comportements pouvant générer des problèmes sanitaires (regroupement près des zones d'ombre, de courant d'air provoquant une détérioration du sol et augmentant le risque de d'apparition de mammites). Voici quelques recommandations pour limiter au maximum les problèmes :

- **Prévention du risque d'acidose** : apporter du bicarbonate dans la ration des vaches laitières (150 à 200g par vache et par jour)
- **Abreuvement de tous les bovins (veaux dès la naissance et adultes)**, avec des abreuvoirs facilement accessibles et ayant un débit suffisant. Par exemple au pâturage, 10% des vaches doivent pouvoir boire en même temps, avec un débit total de l'eau supérieur à 15L par vache et par heure.
- **Protection contre le soleil** : privilégier les parcelles ombragées ou ayant un abri ventilé. Mettre les vaches au pâturage le soir et la nuit, les laisser dans le bâtiment la journée ou laissez-leur la possibilité de choisir.
- **Optimisation de la ventilation** : retirer dans et autour des bâtiments de la stabulation les obstacles qui gêneraient la ventilation. Installer, nettoyer des ventilateurs dans le bâtiment
- **Optimisation de la gestion de la nourriture et de l'eau** : nettoyer quotidiennement les auges, accepter plus de refus, augmenter la fréquence de distribution et distribuer de préférence le soir (pour limiter l'échauffement de la ration pendant la journée)
- **Prévention contre les contaminations de la mamelle** : utiliser un post trempage à effet barrière et cosmétique (Novactiv Film, Iododip, ...)
- **Détoxification, soutien des fonctions immunitaires** : il est possible de faire une cure de 6 jours de **Draistim** (produit à base de plante) à tout le troupeau après un épisode de chaleur

Novactiv Feet XL, nouveau produit d'hygiène contre la dermatite

Lorsque la dermatite prend une ampleur importante dans le cheptel, les traitements collectifs (pédiluve ou pulvérisation) font partie des principaux moyens de lutte à la fois pour limiter la gravité des boiteries, améliorer les lésions mais aussi pour limiter les contaminations des vaches qui ne sont pas encore atteintes.

Novactiv Feet XL, produit dernièrement référencé chez nous, s'utilise aussi bien en pulvérisation qu'en pédiluve. Il est à base de tensio-actif permettant un contact efficace entre le sabot et le produit, même en présence de matière organique et de désinfectants à base d'amine conférant une action bactéricide en à peine 5 minutes.


Le saviez-vous ?

- La pulvérisation est la solution ayant le meilleur rapport qualité prix.
- pour qu'un traitement collectif soit efficace, un nettoyage préalable des sabots est nécessaire (par exemple en début de traite)
- la mise en place d'un traitement collectif se fait de manière progressive. Exemple, en cas de pulvérisation en salle de traite, commencez d'abord pendant quelques jours à habituer les vaches à avoir les pattes lavées.

Protocole à effectuer sur 4 traites successives par semaine

	Semaine 1	Semaine 2	Semaine 3	Semaine 4
Posologie renforcée	NOVACTIV® FEET XL	NOVACTIV® FEET XL	NOVACTIV® FEET XL	NOVACTIV® FEET XL
Posologie préventive	NOVACTIV® FEET XL		NOVACTIV® FEET XL	

Conseils d'utilisation



En pulvérisation



En pédiluve

