

## CLINIQUE VETERINAIRE DES MARCHES DE BRETAGNE

Zone de la Meslais  
4, rue Pierre Harel  
35133 LECOUSSE

2 bis place de la République  
35300 FOUGERES

47, Bd du Maréchal Leclerc  
35 460 ST BRICE EN COGLES

### LETTRE D'INFORMATION SEPTEMBRE 2022

#### Bactériologie de lait : j'ai le réflexe « Kit Bactériologie »

**Le saviez-vous ?** les vaches à prélever en priorité sont les vaches qui présentent le premier épisode de mammite ou les vaches cellulaires (dans ce cas-là, prélevez le quartier qui réagit le plus au CMT).

Il est préférable d'éviter de prélever les vaches multirécidivistes.

**Malin !** la feuille de commémoratifs contient à son verso les recommandations pour effectuer un prélèvement de qualité.

Le retour des éleveurs ayant eu cette formation sont très bons, ils abordent cet acte avec plus de sérénité.

Les **avantages** d'une formation individuelle :  
- vous vous exercez sur vos veaux  
- vous manipulez suffisamment pour acquérir une autonomie  
- vos veaux sont écornés à la fin de la séance.

Une mammite coûte en moyenne entre 170€ et 230€ dont 84€ de chute de production consécutive à la mammite. Elle peut aussi avoir d'autres impacts négatifs, notamment sur la reproduction : augmentation du taux d'IA (+0,5 IA) et du nombre de jours non gestants (+52 jours).

Les mammites sont provoquées par des bactéries (E. coli, Staphylocoques, Streptocoques...) et l'approche en termes de traitement et prévention ne sera pas la même en fonction de la bactérie isolée. Il est donc important d'identifier la bactérie pour mieux la combattre.

Dans une exploitation, les mammites sont souvent provoquées successivement par plusieurs bactéries (il existe cependant souvent un germe dominant responsable de la majorité des mammites). Se contenter d'une seule analyse c'est prendre le risque d'orienter les stratégies de traitement et de prévention vers le germe minoritaire. Il est donc fortement recommandé de multiplier les analyses bactériologiques (**au minimum 5 analyses**) pour mieux cerner le germe majoritaire responsable des mammites de votre exploitation.

Les mammites n'apparaissent pas non plus au même stade de lactation (début, milieu, fin de lactation ou tarissement) et peuvent toucher tous les rangs de lactation (primipares, multipares) ou une catégorie plus que l'autre.

Parce que ces renseignements sont indispensables pour nous permettre de vous conseiller le plus précisément possible, nous avons mis en place le « **kit bactériologie** » composé d'un pot de prélèvement stérile et d'une fiche de commémoratifs comportant les informations importantes à nous communiquer. Une feuille de commémoratifs est jointe à la lettre mensuelle.

#### Pour que l'écornage devienne un plaisir !

**Le saviez-vous ?** L'absence de prise en charge de la douleur lors de l'écornage génère une perte de GMQ de 650g par jour pendant 10 jours soit une perte de 6,5Kg. Cette perte est essentiellement liée à une détérioration de l'indice de conversion : la génisse continue à manger mais valorise moins la ration.

Nous vous proposons de venir vous former dans votre exploitation à l'écornage de vos veaux.

Concrètement, comment ça se passe ? pour la formation, vous nous mettez à disposition entre 3 et 5 veaux âgés de 3 semaines à 2 mois. Sur le premier veau, nous vous montrons les techniques de tranquillisation, d'anesthésie locale, de gestion de la douleur et de l'écornage. Ensuite c'est vous qui pratiquez sur les autres veaux sous notre supervision.

A l'issue de cette formation individuelle, vous connaîtrez le protocole complet ainsi que la technique de la prise en charge de la douleur. Nous vous délivrerons également une attestation d'aptitude à la gestion de l'écornage sans douleur.

## Contre la dermatite digitée, privilégiez les solutions non antibiotiques !

### Le saviez-vous ?

Le pédiluve constitue un des outils disponibles pour gérer les problèmes de boiterie. Seul, il ne permet pas de gérer toute la problématique « Boiterie », ce n'est pas la solution miracle.

Nous pouvons vous accompagner dans la gestion des problèmes de boiterie et vous proposer les solutions les plus adaptées à votre situation.

Pour en savoir plus sur la gamme Digiderm :



La dermatite digitée, très répandue dans les élevages, est souvent traitée individuellement par le biais de bombe spray antibiotique pouvant occasionner la présence de résidus antibiotiques dans l'environnement.

Il existe d'autres solutions efficaces à base par exemple d'antiseptiques. La clinique vous propose différentes solutions :

<b>Individuel</b>	<b>Intra Hoof Fit Gel</b>	Jour 0 : Appliquer le gel sur la lésion et couvrir avec un pansement. Jour 3 : Enlever le pansement et appliquer le gel à nouveau, sans pansement. Jour 7 : Si la guérison n'est pas complète, faire une nouvelle application du gel sans pansement.
	<b>Intra Repiderma</b>	Bombe aérosol. Renouveler l'application toutes les 12h.
	<b>Digiderm 600</b>	Contient 60% d'acide salicylique. Présentation sous forme de cartouche. Application sous pansement maintenu 5 jours.
<b>Collectif en pédiluve ou pulvérisation</b>	<b>Pink Step</b>	Dilution à 5%. Agrée en agriculture biologique
	<b>Digiderm Prémix</b>	Dilution à 2%. Conservation 24h du mélange. Disponible en 15L, 120L et 200L

L'intérêt des traitements collectifs réside dans le fait qu'ils permettent de traiter des lésions venant d'apparaître, avant même que la vache ne manifeste de la boiterie. Cette précocité permet d'améliorer les chances de guérison. Il est important de respecter une régularité dans la fréquence d'application, par exemple tous les 15 jours.

## Contre les maladies respiratoires, j'ai le réflexe Prévention !

L'automne et l'hiver sont les saisons les plus à risque de maladies respiratoires chez les veaux, d'autant plus qu'à cette période tous les animaux sont rentrés en stabulation.

Pour éviter que les problèmes n'apparaissent et aboutissent parfois à des situations très graves, le recours à la **vaccination** est fortement conseillé, et ce avant que la maladie n'apparaisse. Il est **donc important de s'y prendre dès maintenant !**

La clinique vétérinaire des Marches de Bretagne vous propose une gamme complète de vaccins :

Nom	Spectre	Protocole
<b>Bovilis Intranasal RSP Live</b>	RSV, Pi3	Utilisable dès 1 semaine d'âge Une dose de 2mL dans une des deux narines Efficace 7 jours après l'administration et pendant 12 semaines (=3 mois)
<b>Bovilis bovigrip</b>	RSV, Pi3, M. haemolytica	Utilisable dès 15 jours d'âge. Deux injections à 4 semaines d'intervalle en SC <b>Efficace 15 jours après la deuxième injection</b>
<b>Bovalto Respi 3</b>	RS, BVD, Pi3	2 doses de 2mL à trois semaines d'intervalle, à partir de deux semaines d'âge en SC, 1 rappel 6 mois après Durée immunité 6 mois Efficace après la deuxième injection