

CLINIQUE VETERINAIRE DES MARCHES DE BRETAGNE

Zone de la Meslais
4, rue Pierre Harel
35133 LECOUSSE

2 bis place de la République
35300 FOUGERES

47, Bd du Maréchal Leclerc
35 460 ST BRICE EN COGLES

LETTRE D'INFORMATION DECEMBRE 2022

Les rendez-vous de décembre à ne pas manquer

Vendredi 9 décembre de 14h à 16h30 : Réunion d'information : « Prévenir les maladies respiratoires et digestives chez le veau. »

Lieu : GAEC FOUILLARD – La Beaujardière - Fleurigné

Au programme de cette réunion :

- Quels sont les agents à l'origine des pathologies respiratoires et des diarrhées néonatales ?
- Quels sont les facteurs de risques à l'origine de ces pathologies ?
- Comment prévenir la pathologie respiratoire et digestive ?
- Quels sont les outils pratiques de suivi et de vaccination en élevage ?

N'hésitez pas à apporter vos colostrums lors de cette réunion, ils seront testés !

Jeudi 15 décembre de 10h30 à 13h30 : Breizh Vet Tour « La Formation dont vous êtes le Héros ! »

Lieu : Salle du Zéphyr, 15 av Pierre Le Treut, Chateaugiron

Après 3 ans d'absence, le Breizh Vet Tour est de retour pour une nouvelle édition basée cette année sous le signe de l'interactivité.

Cette formation, réunissant environ 500 éleveurs du département, est préparée et animée par des vétérinaires bretons dont des vétérinaires de la clinique (Sophie ROUANNE et Frédéric DONON).

Pour la prochaine session, beaucoup de thèmes seront abordés : reproduction, boiterie... La formation se basera sur une ferme fictive et ce sera au public de faire évoluer la présentation au moyen de boitiers interactifs. Des questions scientifiques seront posées, des choix seront à faire et, à la fin de la formation, des cadeaux seront à gagner, dont un week-end de remplacement !

Cette réunion mêlant à la fois science et humour sera suivie d'un cocktail déjeunatoire.

Diagnostic parasitaire, il est encore temps !

Pour objectiver l'exposition aux strongles digestifs de vos animaux, il existe différents prélèvements en fonction de l'âge des bovins :

- **Génisses de 1ère saison de pâture** : dosage du pepsinogène sérique à partir de prélèvement de sang. Pour être interprétable, il est nécessaire de prélever 5 génisses du même lot.
- **Vaches en lactation** : mesure de la densité optique à partir d'un échantillon de lait de tank pour une recherche de strongles.
 - o Pour effectuer un prélèvement à partir du lait de tank, il est nécessaire d'utiliser des pots de prélèvement avec conservateur (bronopol) remplis à moitié et de nous les apporter à la clinique (attention à bien mélanger le lait avec le conservateur et de mettre le prélèvement au congélateur). Vous pouvez récupérer des pots de prélèvement à la clinique.



SAVE THE DATE !!!

Vous pouvez vous inscrire à l'une et/ou à l'autre réunion en téléphonant au 02.99.94.43.09

Prolongation de l'offre promotionnelle en décembre (remise de 50% sur les analyses)

Le saviez-vous ? Pour la douve, le prélèvement de choix est une prise de sang. Il est nécessaire de prélever 7 à 10 bovins (une analyse de mélange sera effectuée)

Quand je vaccine, je Multiminn !

Le Multiminn est un complexe d'oligo-éléments (Cuivre, Zinc, Sélénium et Manganèse) administré par voie injectable, permettant une disponibilité quasi-totale des molécules après administration.

Des études, notamment françaises, ont montré qu'administrer du Multiminn au moment de la vaccination des animaux (vaccination des veaux contre les maladies respiratoires ou vaccination des vaches tarées contre les diarrhées des veaux) permettait d'améliorer la réponse vaccinale des animaux vaccinés et ainsi d'obtenir de meilleurs colostrums.

Le TOP-UP, vous connaissez ? Le besoin quotidien en oligo-éléments est couvert par l'alimentation (fourrages, concentrés) et la nécessaire complémentation minérale et vitaminique (CMV) par voie orale. Mais lors des phases critiques d'élevage qui jalonnent la vie d'un bovin, les besoins en oligo-éléments sont augmentés. Cette complémentation minérale peut alors être insuffisante. Le TOP-UP en oligo-éléments correspond à une supplémentation additionnelle rapide, précise et efficace des bovins par voie injectable, qui s'ajoute à la complémentation minérale par voie orale précédemment évoquée. Il vise à couvrir l'augmentation transitoire des besoins au regard d'une phase de stress physiologique (tarissement, vêlage, naissance), pathologique (mammite, diarrhées ou pneumonie...) ou zootechnique (sevrage, écornage...).

Gestion du pâturage tournant dynamique, les fondamentaux

Le 9 novembre a eu lieu la formation sur le pâturage tournant dynamique animée par Mathieu BESSIERE. Voici les fondamentaux :

- **Une prairie résiste bien quand elle est âgée.** Au cours de 5 premières années, elle a tendance à s'épuiser puis elle devient plus résistante pour les années qui suivent. Il n'est donc pas forcément nécessaire de retourner des prairies trop vite !
- **Ne pas compacter le sol :** il est important d'éviter le surpâturage, le passage des engins agricoles notamment par temps humide, les piétinements prolongés des parcelles (il faut être prêt à rentrer les animaux si les pâtures ne donnent pas assez d'herbe) et éviter des épandages excessifs.
- **Ne pas rentrer les animaux trop tôt sur les pâtures :** le meilleur stade est le stade 2,5 feuilles au printemps ou 3 feuilles après. La hauteur d'herbe n'est pas forcément le meilleur indicateur. Par moment la hauteur semble correcte alors que l'herbe n'a pas atteint son stade optimal pour être broutée.
- **Pas de surpâturage !** la durée de présence dans les parcelles ne doit pas excéder 3 jours, au-delà une repousse risque d'être à nouveau consommée rendant difficile la croissance de l'herbe après l'occupation de la parcelle. La durée idéale est d'une journée : la vache aura prélevé la partie superficielle de l'herbe, celle qui correspond au volume consommé le plus important et l'herbe restante aura un résiduel de feuille permettant de partir plus vite en croissance.
- **Le déprimage doit être terminé le 5 avril.** Cela correspond à une mise à l'herbe précoce, vers le 25 février ! Rater le déprimage c'est diminuer la production de l'herbe pendant la saison de pâturage.
- **Un pâturage efficace ne peut difficilement se passer du débrayage :** il est préférable d'avoir « trop » de paddocks que pas assez pour pouvoir gérer de manière optimale le pâturage.
- **Eviter la fauche des prairies en fin de saison de pâturage :** l'enrubannage produit se conservera mal à cause de la pauvreté de l'herbe en sucre. Il est possible de faire pâturer les génisses pendant la saison hivernale

Les volumes à injecter sont très réduits : 1mL pour un veau nouveau-né, 7mL pour une vache laitière de 700Kg. Le coût d'une injection est donc également minimale : environ 0,9€ le mL !



Comment savoir que ma parcelle a été surpâturée ? Il ne doit pas y avoir de changement de couleur entre l'entrée et la sortie de la parcelle.



Test de la motte de terre : une motte de terre doit avoir au minimum 3 vers de terre visibles dès retournement !